

Lokalt ekstremum Uge 12

Preben Alsholm

Efterår 2010

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

- ▶ Lad x_0 være et stationært punkt for f . Antag, at $f''(x_0)$ eksisterer. Så gælder:

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

- ▶ Lad x_0 være et stationært punkt for f . Antag, at $f''(x_0)$ eksisterer. Så gælder:
 1. Hvis $f''(x_0) < 0$, så er x_0 et egentligt lokalt maksimumspunkt for f .

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

- Lad x_0 være et stationært punkt for f . Antag, at $f''(x_0)$ eksisterer. Så gælder:
1. Hvis $f''(x_0) < 0$, så er x_0 et egentligt lokalt maksimumspunkt for f .
 2. Hvis $f''(x_0) > 0$, så er x_0 et egentligt lokalt minimumspunkt for f .

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant

II

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

- ▶ Lad x_0 være et stationært punkt for f . Antag, at $f''(x_0)$ eksisterer. Så gælder:
 1. Hvis $f''(x_0) < 0$, så er x_0 et egentligt lokalt maksimumspunkt for f .
 2. Hvis $f''(x_0) > 0$, så er x_0 et egentligt lokalt minimumspunkt for f .

▶ Bevis:

$$f''(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h)}{h}$$

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

- ▶ Lad x_0 være et stationært punkt for f . Antag, at $f''(x_0)$ eksisterer. Så gælder:
 1. Hvis $f''(x_0) < 0$, så er x_0 et egentligt lokalt maksimumspunkt for f .
 2. Hvis $f''(x_0) > 0$, så er x_0 et egentligt lokalt minimumspunkt for f .

- ▶ Bevis:

$$f''(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h)}{h}$$

- ▶ Så $f''(x_0) < 0$ betyder, at for $|h|$ lille nok gælder

$$\frac{f'(x_0 + h)}{h} < \frac{1}{2} f''(x_0) < 0$$

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

- ▶ Lad x_0 være et stationært punkt for f . Antag, at $f''(x_0)$ eksisterer. Så gælder:
 1. Hvis $f''(x_0) < 0$, så er x_0 et egentligt lokalt maksimumspunkt for f .
 2. Hvis $f''(x_0) > 0$, så er x_0 et egentligt lokalt minimumspunkt for f .

- ▶ Bevis:

$$f''(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h)}{h}$$

- ▶ Så $f''(x_0) < 0$ betyder, at for $|h|$ lille nok gælder

$$\frac{f'(x_0 + h)}{h} < \frac{1}{2} f''(x_0) < 0$$

- ▶ For $h > 0$ betyder dette, at $f'(x_0 + h) < 0$

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

- ▶ Lad x_0 være et stationært punkt for f . Antag, at $f''(x_0)$ eksisterer. Så gælder:
 1. Hvis $f''(x_0) < 0$, så er x_0 et egentligt lokalt maksimumspunkt for f .
 2. Hvis $f''(x_0) > 0$, så er x_0 et egentligt lokalt minimumspunkt for f .

- ▶ Bevis:

$$f''(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h)}{h}$$

- ▶ Så $f''(x_0) < 0$ betyder, at for $|h|$ lille nok gælder

$$\frac{f'(x_0 + h)}{h} < \frac{1}{2} f''(x_0) < 0$$

- ▶ For $h > 0$ betyder dette, at $f'(x_0 + h) < 0$
- ▶ og for $h < 0$ betyder det, at $f'(x_0 + h) > 0$.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant

II

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

- ▶ Lad x_0 være et stationært punkt for f . Antag, at $f''(x_0)$ eksisterer. Så gælder:
 1. Hvis $f''(x_0) < 0$, så er x_0 et egentligt lokalt maksimumspunkt for f .
 2. Hvis $f''(x_0) > 0$, så er x_0 et egentligt lokalt minimumspunkt for f .

- ▶ Bevis:

$$f''(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h)}{h}$$

- ▶ Så $f''(x_0) < 0$ betyder, at for $|h|$ lille nok gælder

$$\frac{f'(x_0 + h)}{h} < \frac{1}{2} f''(x_0) < 0$$

- ▶ For $h > 0$ betyder dette, at $f'(x_0 + h) < 0$
- ▶ og for $h < 0$ betyder det, at $f'(x_0 + h) > 0$.
- ▶ Men så må x_0 være et maksimumspunkt.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant

II

- Lad f være en funktion af n variable. Antag, at f har partielle afledede af anden orden i punktet $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Hessematricen for f i punktet a er den matrix $H(a)$, hvis element (i, j) er

$$f''_{x_i x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

- ▶ Lad f være en funktion af n variable. Antag, at f har partielle afledede af anden orden i punktet $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Hessematricen for f i punktet a er den matrix $H(a)$, hvis element (i, j) er

$$f''_{x_i x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

- ▶ Er f en funktion af 2 variable er Hessematricen i punktet $a = (a_1, a_2)$ altså givet ved

$$H(a_1, a_2) = \begin{bmatrix} f''_{x_1 x_1}(a_1, a_2) & f''_{x_1 x_2}(a_1, a_2) \\ f''_{x_1 x_2}(a_1, a_2) & f''_{x_2 x_2}(a_1, a_2) \end{bmatrix}$$

Hessematricen II

- Er f en funktion af 3 variable er Hessematricen i punktet $a = (a_1, a_2, a_3)$ givet ved

$$H(a) = \begin{bmatrix} f''_{x_1x_1}(a) & f''_{x_1x_2}(a) & f''_{x_1x_3}(a) \\ f''_{x_1x_2}(a) & f''_{x_2x_2}(a) & f''_{x_2x_3}(a) \\ f''_{x_1x_3}(a) & f''_{x_2x_3}(a) & f''_{x_3x_3}(a) \end{bmatrix}$$

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

Hessematricen II

- ▶ Er f en funktion af 3 variable er Hessematricen i punktet $a = (a_1, a_2, a_3)$ givet ved

$$H(a) = \begin{bmatrix} f''_{x_1x_1}(a) & f''_{x_1x_2}(a) & f''_{x_1x_3}(a) \\ f''_{x_1x_2}(a) & f''_{x_2x_2}(a) & f''_{x_2x_3}(a) \\ f''_{x_1x_3}(a) & f''_{x_2x_3}(a) & f''_{x_3x_3}(a) \end{bmatrix}$$

- ▶ Eksempel. Funktionen f givet ved $f(x, y) = x^2 - x^2y + 2y^2$ har partielle afledede

$$f'_x(x, y) = 2x - 2xy \text{ og } f'_y(x, y) = -x^2 + 4y$$

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

- ▶ Er f en funktion af 3 variable er Hessematricen i punktet $a = (a_1, a_2, a_3)$ givet ved

$$H(a) = \begin{bmatrix} f''_{x_1x_1}(a) & f''_{x_1x_2}(a) & f''_{x_1x_3}(a) \\ f''_{x_1x_2}(a) & f''_{x_2x_2}(a) & f''_{x_2x_3}(a) \\ f''_{x_1x_3}(a) & f''_{x_2x_3}(a) & f''_{x_3x_3}(a) \end{bmatrix}$$

- ▶ Eksempel. Funktionen f givet ved $f(x, y) = x^2 - x^2y + 2y^2$ har partielle afledede

$$f'_x(x, y) = 2x - 2xy \text{ og } f'_y(x, y) = -x^2 + 4y$$

- ▶ Hessematricen i punktet (x, y) er

$$\begin{bmatrix} 2 - 2y & -2x \\ -2x & 4 \end{bmatrix}$$

Hessematrixen III

- ▶ Lad f være en funktion af n variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Antag, at a er et stationært punkt for f . Lad $H(a)$ være Hessematrixen for f i a .

Hessematricen III

- ▶ Lad f være en funktion af n variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Antag, at a er et stationært punkt for f . Lad $H(a)$ være Hessematricen for f i a .
- ▶ Så gælder

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

Hessematricen III

- ▶ Lad f være en funktion af n variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Antag, at a er et stationært punkt for f . Lad $H(a)$ være Hessematricen for f i a .
- ▶ Så gælder
 1. Hvis egenverdierne for $H(a)$ alle er positive, så er a et egentligt minimumspunkt.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

Hessematricen III

- ▶ Lad f være en funktion af n variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Antag, at a er et stationært punkt for f . Lad $H(a)$ være Hessematricen for f i a .
- ▶ Så gælder
 1. Hvis egenverdierne for $H(a)$ alle er positive, så er a et egentligt minimumspunkt.
 2. Hvis egenverdierne alle er negative, er a et egentligt maksimumspunkt.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

Hessematricen III

- ▶ Lad f være en funktion af n variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Antag, at a er et stationært punkt for f . Lad $H(a)$ være Hessematricen for f i a .
- ▶ Så gælder
 1. Hvis egenværdierne for $H(a)$ alle er positive, så er a et egentligt minimumspunkt.
 2. Hvis egenværdierne alle er negative, er a et egentligt maksimumspunkt.
 3. Hvis to af egenværdierne har forskellige fortegn, så er a et egentligt saddelepunkt.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

Hessematrixen III

- ▶ Lad f være en funktion af n variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Antag, at a er et stationært punkt for f . Lad $H(a)$ være Hessematrixen for f i a .
- ▶ Så gælder
 1. Hvis egenverdierne for $H(a)$ alle er positive, så er a et egentligt minimumspunkt.
 2. Hvis egenverdierne alle er negative, er a et egentligt maksimumspunkt.
 3. Hvis to af egenverdierne har forskellige fortegn, så er a et egentligt saddelepunkt.
 4. Hvis mindst én af egenverdierne er lig med nul og resten har samme fortegn, så må en nærmere undersøgelse foretages.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

Hessematrixen III

- ▶ Lad f være en funktion af n variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Antag, at a er et stationært punkt for f . Lad $H(a)$ være Hessematrixen for f i a .
- ▶ Så gælder
 1. Hvis egenverdierne for $H(a)$ alle er positive, så er a et egentligt minimumspunkt.
 2. Hvis egenverdierne alle er negative, er a et egentligt maksimumspunkt.
 3. Hvis to af egenverdierne har forskellige fortegn, så er a et egentligt saddepunkt.
 4. Hvis mindst én af egenverdierne er lig med nul og resten har samme fortegn, så må en nærmere undersøgelse foretages.
- ▶ a er et *egentligt* saddepunkt, hvis der eksisterer en ret linie gennem a langs hvilken f har egentligt maksimum og en ret linie gennem a langs hvilken f har egentligt minimum.

Hessematricen IV

- ▶ Beviset bygger på Taylors formel for funktion af flere variable (her 2):

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + \nabla f(a) \cdot h + \frac{1}{2} D_h^2(f)(a + \zeta h) \\ &= f(a) + f_{x_1}(a) h_1 + f_{x_2}(a) h_2 \\ &\quad + \frac{1}{2} (f''_{x_1 x_1}(a + \zeta h) h_1^2 + 2f''_{x_1 x_2}(a + \zeta h) h_1 h_2 + f''_{x_2 x_2}(a + \zeta h) h_2^2) \\ &= f(a) + f_{x_1}(a) h_1 + f_{x_2}(a) h_2 + \frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h \end{aligned}$$

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spørg og determinant

Spørg og determinant II

Hessematricen IV

- ▶ Beviset bygger på Taylors formel for funktion af flere variable (her 2):

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + \nabla f(a) \cdot h + \frac{1}{2} D_h^2(f)(a + \zeta h) \\ &= f(a) + f_{x_1}(a) h_1 + f_{x_2}(a) h_2 \\ &\quad + \frac{1}{2} (f''_{x_1 x_1}(a + \zeta h) h_1^2 + 2f''_{x_1 x_2}(a + \zeta h) h_1 h_2 + f''_{x_2 x_2}(a + \zeta h) h_2^2) \\ &= f(a) + f_{x_1}(a) h_1 + f_{x_2}(a) h_2 + \frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h \end{aligned}$$

- ▶ I et stationært punkt a fås dermed

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h$$

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spørgsmål 1: stationært

Spørgsmål 2: stationært

II

Hessematricen IV

- ▶ Beviset bygger på Taylors formel for funktion af flere variable (her 2):

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + \nabla f(a) \cdot h + \frac{1}{2} D_h^2(f)(a + \zeta h) \\ &= f(a) + f_{x_1}(a) h_1 + f_{x_2}(a) h_2 \\ &\quad + \frac{1}{2} (f''_{x_1 x_1}(a + \zeta h) h_1^2 + 2f''_{x_1 x_2}(a + \zeta h) h_1 h_2 + f''_{x_2 x_2}(a + \zeta h) h_2^2) \\ &= f(a) + f_{x_1}(a) h_1 + f_{x_2}(a) h_2 + \frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h \end{aligned}$$

- ▶ I et stationært punkt a fås dermed

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h$$

- ▶ Det afgørende er dermed fortegnet for $\frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h$ for små h .

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spørgsmål 1: stationært

Spørgsmål 2: stationært

II

Hessematricen IV

- ▶ Beviset bygger på Taylors formel for funktion af flere variable (her 2):

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + \nabla f(a) \cdot h + \frac{1}{2} D_h^2(f)(a + \zeta h) \\ &= f(a) + f_{x_1}(a) h_1 + f_{x_2}(a) h_2 \\ &\quad + \frac{1}{2} (f''_{x_1 x_1}(a + \zeta h) h_1^2 + 2f''_{x_1 x_2}(a + \zeta h) h_1 h_2 + f''_{x_2 x_2}(a + \zeta h) h_2^2) \\ &= f(a) + f_{x_1}(a) h_1 + f_{x_2}(a) h_2 + \frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h \end{aligned}$$

- ▶ I et stationært punkt a fås dermed

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h$$

- ▶ Det afgørende er dermed fortegnet for $\frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h$ for små h .
- ▶ Hvis $H(a)$ har udelukkende positive egenverdier, så er $h^T H(a) h > 0$ for alle h .

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spørgsmål 1 (del 2)

Spørgsmål 2 (del 2)

II

Hessematricen IV

- ▶ Beviset bygger på Taylors formel for funktion af flere variable (her 2):

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + \nabla f(a) \cdot h + \frac{1}{2} D_h^2(f)(a + \zeta h) \\ &= f(a) + f_{x_1}(a) h_1 + f_{x_2}(a) h_2 \\ &\quad + \frac{1}{2} (f''_{x_1 x_1}(a + \zeta h) h_1^2 + 2f''_{x_1 x_2}(a + \zeta h) h_1 h_2 + f''_{x_2 x_2}(a + \zeta h) h_2^2) \\ &= f(a) + f_{x_1}(a) h_1 + f_{x_2}(a) h_2 + \frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h \end{aligned}$$

- ▶ I et stationært punkt a fås dermed

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h$$

- ▶ Det afgørende er dermed fortegnet for $\frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h$ for små h .
- ▶ Hvis $H(a)$ har udelukkende positive egenverdier, så er $h^T H(a) h > 0$ for alle h .
- ▶ Vi har dog ikke $H(a)$, men $H(a + \zeta h)$.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spørgsmål 1: Hvert punkt

Spørgsmål 2: Hvert punkt

II

Hessematricen V

- Med $e = \frac{h}{\|h\|}$ er $\|e\| = 1$ og vi finder af $f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}h^T H(a + \zeta h) h$, at

$$\begin{aligned} \frac{2}{\|h\|^2} (f(a+h) - f(a)) &= e^T H(a + \zeta h) e \\ &= e^T H(a) e + e^T (H(a + \zeta h) - H(a)) e \end{aligned}$$

Hessematrixen V

- Med $e = \frac{h}{\|h\|}$ er $\|e\| = 1$ og vi finder af
 $f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}h^T H(a + \zeta h) h$, at

$$\begin{aligned} \frac{2}{\|h\|^2} (f(a+h) - f(a)) &= e^T H(a + \zeta h) e \\ &= e^T H(a) e + e^T (H(a + \zeta h) - H(a)) e \end{aligned}$$

- Ved at vælge $\|h\|$ lille nok kan sidste led gøres mindre end et vilkårligt givet $\varepsilon > 0$.

Hessematrixen V

- ▶ Med $e = \frac{h}{\|h\|}$ er $\|e\| = 1$ og vi finder af
 $f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}h^T H(a + \zeta h) h$, at

$$\begin{aligned} \frac{2}{\|h\|^2} (f(a+h) - f(a)) &= e^T H(a + \zeta h) e \\ &= e^T H(a) e + e^T (H(a + \zeta h) - H(a)) e \end{aligned}$$

- ▶ Ved at vælge $\|h\|$ lille nok kan sidste led gøres mindre end et vilkårligt givet $\varepsilon > 0$.
- ▶ Vælg Q ortogonal og så $Q^T H(a) Q = \Lambda$ er diagonal.

Hessematrixen V

- ▶ Med $e = \frac{h}{\|h\|}$ er $\|e\| = 1$ og vi finder af
 $f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}h^T H(a + \zeta h) h$, at

$$\begin{aligned} \frac{2}{\|h\|^2} (f(a+h) - f(a)) &= e^T H(a + \zeta h) e \\ &= e^T H(a) e + e^T (H(a + \zeta h) - H(a)) e \end{aligned}$$

- ▶ Ved at vælge $\|h\|$ lille nok kan sidste led gøres mindre end et vilkårligt givet $\varepsilon > 0$.
- ▶ Vælg Q ortogonal og så $Q^T H(a) Q = \Lambda$ er diagonal.
- ▶ Så fås med $e = Qw$ at $e^T H(a) e = w^T Q^T H(a) Q w = w^T \Lambda w = \lambda_1 w_1^2 + \lambda_2 w_2^2$.

Hessematrixen V

- ▶ Med $e = \frac{h}{\|h\|}$ er $\|e\| = 1$ og vi finder af
 $f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}h^T H(a + \zeta h) h$, at

$$\begin{aligned} \frac{2}{\|h\|^2} (f(a+h) - f(a)) &= e^T H(a + \zeta h) e \\ &= e^T H(a) e + e^T (H(a + \zeta h) - H(a)) e \end{aligned}$$

- ▶ Ved at vælge $\|h\|$ lille nok kan sidste led gøres mindre end et vilkårligt givet $\varepsilon > 0$.
- ▶ Vælg Q ortogonal og så $Q^T H(a) Q = \Lambda$ er diagonal.
- ▶ Så fås med $e = Qw$ at $e^T H(a) e = w^T Q^T H(a) Q w = w^T \Lambda w = \lambda_1 w_1^2 + \lambda_2 w_2^2$.
- ▶ Hvis nu $\lambda_2 \geq \lambda_1 > 0$ fås dermed
 $e^T H(a) e \geq \lambda_1 (w_1^2 + w_2^2) = \lambda_1 \|w\|^2 =$
 $\lambda_1 \|Q^T e\|^2 = \lambda_1 \|e\|^2 = \lambda_1$.

Hessematrixen V

- Med $e = \frac{h}{\|h\|}$ er $\|e\| = 1$ og vi finder af
 $f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} h^T H(a + \zeta h) h$, at

$$\begin{aligned} \frac{2}{\|h\|^2} (f(a+h) - f(a)) &= e^T H(a + \zeta h) e \\ &= e^T H(a) e + e^T (H(a + \zeta h) - H(a)) e \end{aligned}$$

- Ved at vælge $\|h\|$ lille nok kan sidste led gøres mindre end et vilkårligt givet $\varepsilon > 0$.
- Vælg Q ortogonal og så $Q^T H(a) Q = \Lambda$ er diagonal.
- Så fås med $e = Qw$ at $e^T H(a) e = w^T Q^T H(a) Q w = w^T \Lambda w = \lambda_1 w_1^2 + \lambda_2 w_2^2$.
- Hvis nu $\lambda_2 \geq \lambda_1 > 0$ fås dermed
 $e^T H(a) e \geq \lambda_1 (w_1^2 + w_2^2) = \lambda_1 \|w\|^2 =$
 $\lambda_1 \|Q^T e\|^2 = \lambda_1 \|e\|^2 = \lambda_1$.
- Derfor gælder for små h , at $h^T H(a + \zeta h) h > 0$. Så a er et egentligt minimumspunkt.

Hessematricen VI

- ▶ Hvis i stedet $\lambda_1 \leq \lambda_2 < 0$ fås tilsvarende $e^T H(a) e = \lambda_1 w_1^2 + \lambda_2 w_2^2 \leq \lambda_2 (w_1^2 + w_2^2) = \lambda_2 \|w\|^2 = \lambda_2$.

Hessematricen VI

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant

II

- ▶ Hvis i stedet $\lambda_1 \leq \lambda_2 < 0$ fås tilsvarende $e^T H(a) e = \lambda_1 w_1^2 + \lambda_2 w_2^2 \leq \lambda_2 (w_1^2 + w_2^2) = \lambda_2 \|w\|^2 = \lambda_2$.
- ▶ Derfor gælder for små h , at $h^T H(a + \zeta h) h < 0$. Så a er et egentligt maksimumspunkt.

Hessematricen VI

- ▶ Hvis i stedet $\lambda_1 \leq \lambda_2 < 0$ fås tilsvarende $e^T H(a) e = \lambda_1 w_1^2 + \lambda_2 w_2^2 \leq \lambda_2 (w_1^2 + w_2^2) = \lambda_2 \|w\|^2 = \lambda_2$.
- ▶ Derfor gælder for små h , at $h^T H(a + \zeta h) h < 0$. Så a er et egentligt maksimumspunkt.
- ▶ Hvis $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ lader vi e være en egenvektor med længde 1 hørende til egenværdien λ_1 .

- ▶ Hvis i stedet $\lambda_1 \leq \lambda_2 < 0$ fås tilsvarende $e^T H(a) e = \lambda_1 w_1^2 + \lambda_2 w_2^2 \leq \lambda_2 (w_1^2 + w_2^2) = \lambda_2 \|w\|^2 = \lambda_2$.
- ▶ Derfor gælder for små h , at $h^T H(a + \zeta h) h < 0$. Så a er et egentligt maksimumspunkt.
- ▶ Hvis $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ lader vi e være en egenvektor med længde 1 hørende til egenværdien λ_1 .
- ▶ Så fås $e^T H(a) e = \lambda_1$. Langs linien $x = a + se$ er $f(a + h) - f(a)$ dermed negativ for små værdier af s . Altså antager f et egentligt maksimum i a langs denne linie.

- ▶ Hvis i stedet $\lambda_1 \leq \lambda_2 < 0$ fås tilsvarende $e^T H(a) e = \lambda_1 w_1^2 + \lambda_2 w_2^2 \leq \lambda_2 (w_1^2 + w_2^2) = \lambda_2 \|w\|^2 = \lambda_2$.
- ▶ Derfor gælder for små h , at $h^T H(a + \zeta h) h < 0$. Så a er et egentligt maksimumspunkt.
- ▶ Hvis $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ lader vi e være en egenvektor med længde 1 hørende til egenværdien λ_1 .
- ▶ Så fås $e^T H(a) e = \lambda_1$. Langs linien $x = a + se$ er $f(a + h) - f(a)$ dermed negativ for små værdier af s . Altså antager f et egentligt maksimum i a langs denne linie.
- ▶ Vælges e i stedet som en egenvektor med længde 1 hørende til egenværdien λ_2 , så ses at f langs linien $x = a + se$ antager et egentligt minimum.

- ▶ Hvis i stedet $\lambda_1 \leq \lambda_2 < 0$ fås tilsvarende $e^T H(a) e = \lambda_1 w_1^2 + \lambda_2 w_2^2 \leq \lambda_2 (w_1^2 + w_2^2) = \lambda_2 \|w\|^2 = \lambda_2$.
- ▶ Derfor gælder for små h , at $h^T H(a + \zeta h) h < 0$. Så a er et egentligt maksimumspunkt.
- ▶ Hvis $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ lader vi e være en egenvektor med længde 1 hørende til egenværdien λ_1 .
- ▶ Så fås $e^T H(a) e = \lambda_1$. Langs linien $x = a + se$ er $f(a + h) - f(a)$ dermed negativ for små værdier af s . Altså antager f et egentligt maksimum i a langs denne linie.
- ▶ Vælges e i stedet som en egenvektor med længde 1 hørende til egenværdien λ_2 , så ses at f langs linien $x = a + se$ antager et egentligt minimum.
- ▶ Konklusionen er, at a er et (egentligt) sadelpunkt.

Eksempel

- ▶ $f(x, y) = x^2 - x^2y + 2y^2$ fra tidligere. Stationære punkter er $(0, 0)$ og $(\pm 2, 1)$.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for
funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spør og determinant

Spør og determinant

II

Eksempel

▶ $f(x, y) = x^2 - x^2y + 2y^2$ fra tidligere. Stationære punkter er $(0, 0)$ og $(\pm 2, 1)$.

▶ Vi fandt tidligere $H(x, y) = \begin{bmatrix} 2 - 2y & -2x \\ -2x & 4 \end{bmatrix}$.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for
funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spør og determinant

Spør og determinant

II

Eksempel

▶ $f(x, y) = x^2 - x^2y + 2y^2$ fra tidligere. Stationære punkter er $(0, 0)$ og $(\pm 2, 1)$.

▶ Vi fandt tidligere $H(x, y) = \begin{bmatrix} 2 - 2y & -2x \\ -2x & 4 \end{bmatrix}$.

▶ Heraf fås

$$H(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad H(2, 1) = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$H(-2, 1) = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Eksempel

- ▶ $f(x, y) = x^2 - x^2y + 2y^2$ fra tidligere. Stationære punkter er $(0, 0)$ og $(\pm 2, 1)$.

- ▶ Vi fandt tidligere $H(x, y) = \begin{bmatrix} 2 - 2y & -2x \\ -2x & 4 \end{bmatrix}$.

- ▶ Heraf fås

$$H(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad H(2, 1) = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$H(-2, 1) = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

- ▶ **Egenverdierne for $H(0, 0)$ er åbenbart 2 og 4, altså positive, så $(0, 0)$ er et egentligt lokalt minimumspunkt.**

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spør og determinant

Spør og determinant

II

Eksempel

- ▶ $f(x, y) = x^2 - x^2y + 2y^2$ fra tidligere. Stationære punkter er $(0, 0)$ og $(\pm 2, 1)$.

- ▶ Vi fandt tidligere $H(x, y) = \begin{bmatrix} 2 - 2y & -2x \\ -2x & 4 \end{bmatrix}$.

- ▶ Heraf fås

$$H(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad H(2, 1) = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$H(-2, 1) = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

- ▶ Eigenverdierne for $H(0, 0)$ er åbenbart 2 og 4, altså positive, så $(0, 0)$ er et egentligt lokalt minimumspunkt.
- ▶ $H(2, 1)$ og $H(-2, 1)$ har de samme egenverdier, nemlig $2 \pm 2\sqrt{5}$. Den ene er dermed positiv, den anden er negativ. Punkterne $(\pm 2, 1)$ er egentlige saddelpunkter.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant

II

Spor og determinant

- ▶ Lad $n \times n$ -matricen A have egenverdierne $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Så gælder, at

$$\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$

$$\text{Spor}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

Spor og determinant

- ▶ Lad $n \times n$ -matricen A have egenverdierne $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Så gælder, at

$$\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$

$$\text{Spor}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

- ▶ **Let bevist for $n = 2$:**

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) = \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2$$

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

Spor og determinant

- ▶ Lad $n \times n$ -matricen A have egenværdierne $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Så gælder, at

$$\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$
$$\text{Spor}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

- ▶ Let bevist for $n = 2$:

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) = \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2$$

- ▶ Men også

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \\ &= \lambda^2 - \text{Spor}(A)\lambda + \det A\end{aligned}$$

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

Spor og determinant

- ▶ Lad $n \times n$ -matricen A have egenværdierne $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Så gælder, at

$$\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$
$$\text{Spor}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

- ▶ Let bevist for $n = 2$:

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) = \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2$$

- ▶ Men også

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix}$$
$$= \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$
$$= \lambda^2 - \text{Spor}(A)\lambda + \det A$$

- ▶ Resultatet følger ved sammenligning.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

Spor og determinant II

- ▶ Lad f være en funktion af to variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet (a, b) . Antag, at (a, b) er et stationært punkt for f . Lad $H(a, b)$ være Hessematricen for f i (a, b) . Så gælder

Spor og determinant II

- ▶ Lad f være en funktion af to variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet (a, b) . Antag, at (a, b) er et stationært punkt for f . Lad $H(a, b)$ være Hessematricen for f i (a, b) . Så gælder

1. Hvis $\det H(a, b) > 0$, så er (a, b) et egentligt ekstremumpunkt.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

Spor og determinant II

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

- ▶ Lad f være en funktion af to variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet (a, b) . Antag, at (a, b) er et stationært punkt for f . Lad $H(a, b)$ være Hessematrixen for f i (a, b) . Så gælder

1. Hvis $\det H(a, b) > 0$, så er (a, b) et egentligt ekstremumpunkt.

1.1 Hvis $\text{Spor}(H(a, b)) > 0$, så er (a, b) et egentligt minimumspunkt.

Spor og determinant II

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

- Lad f være en funktion af to variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet (a, b) . Antag, at (a, b) er et stationært punkt for f . Lad $H(a, b)$ være Hessematrixen for f i (a, b) . Så gælder

1. Hvis $\det H(a, b) > 0$, så er (a, b) et egentligt ekstremumpunkt.
 - 1.1 Hvis $\text{Spor}(H(a, b)) > 0$, så er (a, b) et egentligt minimumspunkt.
 - 1.2 Hvis $\text{Spor}(H(a, b)) < 0$, så er (a, b) et egentligt maksimumspunkt.

Spor og determinant II

- Lad f være en funktion af to variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet (a, b) . Antag, at (a, b) er et stationært punkt for f . Lad $H(a, b)$ være Hessematricen for f i (a, b) . Så gælder

1. Hvis $\det H(a, b) > 0$, så er (a, b) et egentligt ekstremumpunkt.
 - 1.1 Hvis $\text{Spor}(H(a, b)) > 0$, så er (a, b) et egentligt minimumspunkt.
 - 1.2 Hvis $\text{Spor}(H(a, b)) < 0$, så er (a, b) et egentligt maksimumspunkt.
2. Hvis $\det H(a, b) < 0$, så er (a, b) et egentligt saddepunkt.

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematricen I

Hessematricen II

Hessematricen III

Hessematricen IV

Hessematricen V

Hessematricen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

Spor og determinant II

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

- Lad f være en funktion af to variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet (a, b) . Antag, at (a, b) er et stationært punkt for f . Lad $H(a, b)$ være Hessematrixen for f i (a, b) . Så gælder

1. Hvis $\det H(a, b) > 0$, så er (a, b) et egentligt ekstremumpunkt.
 - 1.1 Hvis $\text{Spor}(H(a, b)) > 0$, så er (a, b) et egentligt minimumspunkt.
 - 1.2 Hvis $\text{Spor}(H(a, b)) < 0$, så er (a, b) et egentligt maksimumspunkt.
2. Hvis $\det H(a, b) < 0$, så er (a, b) et egentligt saddelpunkt.
3. Hvis $\det H(a, b) = 0$ må en nærmere undersøgelse foretages.

Spor og determinant II

Lokalt ekstremum

Lokalt ekstremum for funktion af én variabel

Hessematrixen I

Hessematrixen II

Hessematrixen III

Hessematrixen IV

Hessematrixen V

Hessematrixen VI

Eksempel

Spor og determinant

Spor og determinant II

- Lad f være en funktion af to variable med kontinuerte partielle afledede op til og med 2. orden i en omegn om punktet (a, b) . Antag, at (a, b) er et stationært punkt for f . Lad $H(a, b)$ være Hessematrixen for f i (a, b) . Så gælder

1. Hvis $\det H(a, b) > 0$, så er (a, b) et egentligt ekstremumpunkt.
 - 1.1 Hvis $\text{Spor}(H(a, b)) > 0$, så er (a, b) et egentligt minimumspunkt.
 - 1.2 Hvis $\text{Spor}(H(a, b)) < 0$, så er (a, b) et egentligt maksimumspunkt.
2. Hvis $\det H(a, b) < 0$, så er (a, b) et egentligt saddelpunkt.
3. Hvis $\det H(a, b) = 0$ må en nærmere undersøgelse foretages.

- Eksempel: $H(2, 1) = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$ fra tidligere.