

# Planintegralet i polære koordinater

Preben Alsholm


8. maj 2008

## 1 Planintegralet i polære koordinater

### 1.1 Polære koordinater i planen I

#### Polære koordinater i planen I

- Den vandrette akse er polaraksen. "O" er polen. Vi betragter et punkt P og tegner en orienteret ret linie gennem O og P.




- Vinklen  $v$  regnes med fortegn.  $r$  regnes positiv, hvis punktet ligger på pilens side af OP, negativ til den anden side.
- P har de polære koordinater  $r$  og  $v$ .

### 1.2 Polære koordinater i planen II

#### Polære koordinater i planen II

- Med retningen på strålen (den orienterede linie gennem O og P) som vist, har den polære koordinat  $r$  en negativ værdi.




- Ønskes en positiv værdi, kan liniens orientering vendes, men så bliver vinklen  $v$  forøget med  $\pi$ .

### 1.3 Overgangsformler

#### Overgangsformler

- Lad x-aksen være polarakse med pol i begyndelsespunktet.



- Overgangsformler, som vi også kender fra komplekse tal:

$$x = r \cos v, y = r \sin v$$

$$r^2 = x^2 + y^2, \tan v = \frac{y}{x}$$

- Sædvanlige  $xy$ -koordinater kaldes ofte for cartesiske koordinater efter René Descartes (latin: Renatus Cartesius) 1596-1650.

### 1.4 Overgangsformler. Eksempler

#### Overgangsformler. Eksempler


- Givet kurven  $r = \cos \theta$  i polære koordinater.
- Vil finde en ligning for kurven i cartesiske koordinater.

- Vi finder  $r = \cos \theta \Rightarrow r^2 = r \cos \theta \Leftrightarrow x^2 + y^2 = x \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ .
- Givet kurven  $r = \sin 2\theta$  i polære koordinater. Vil finde en ligning for kurven i cartesiske koordinater.
- Vi finder  $r = \sin 2\theta \Leftrightarrow r = 2 \sin \theta \cos \theta \Rightarrow r^3 = 2r \sin \theta \cdot r \cos \theta \Leftrightarrow r^3 = 2xy \Rightarrow r^6 = 4x^2y^2 \Rightarrow (x^2 + y^2)^3 = 4x^2y^2$ .
- Givet linien  $y = -\frac{1}{2}x + 1$  i cartesiske koordinater. Find en ligning i polære koordinater.
- Vi finder  $r \sin \theta = -\frac{1}{2}r \cos \theta + 1$ , der kan løses for  $r$ . Vi finder  $r = \frac{2}{2 \sin \theta + \cos \theta}$ .

## 1.5 Planintegralet i polære koordinater

### Planintegralet i polære koordinater

- Området  $D$  er vist på figuren:



- Vi har


$$\iint_D f(x, y) dA = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r \cdot dr$$

- hvor man specielt skal bemærke det ekstra  $r$ . Se Maple-worksheet.

## 1.6 Eksempel 0

### Eksempel 0

- $D$  er området uden for cirklen  $x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$  og indenfor kardioiden  $r = 1 + \sin \theta$  med  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ . Cirklen kan i polære koordinater skrives  $r = \sin \theta$ .



- Vi vil først finde arealet af  $D$ :  $\iint_D 1 dA = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\sin\theta}^{1+\sin\theta} r dr$
- Inderste integral udregnes, hvorved fås  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[ \frac{1}{2} r^2 \right]_{\sin\theta}^{1+\sin\theta} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left( (1 + \sin\theta)^2 - \sin^2\theta \right) d\theta$
- Yderste integral er nu  $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + 2 \sin\theta) d\theta = \frac{1}{2} [\theta - 2 \cos\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{8} - \frac{\sqrt{2}}{2} + 1$

## 1.7 Eksempel 0 fortsat

### Eksempel 0 fortsat

- Derefter integralet  $\iint_D x dA$ :

$$\iint_D x dA = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\sin\theta}^{1+\sin\theta} r \cos\theta \cdot r dr$$

- Inderste integral udregnes:

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos\theta \left[ \frac{1}{3} r^3 \right]_{\sin\theta}^{1+\sin\theta} d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos\theta \left( (1 + \sin\theta)^3 - \sin^3\theta \right) d\theta$$

- Substitutionen  $t = \sin\theta$  giver  $dt = \cos\theta d\theta$ , så vi får

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left( (1+t)^3 - t^3 \right) dt = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (3t^2 + 3t + 1) dt \\ &= \frac{1}{3} \left[ t^3 + \frac{3}{2}t^2 + t \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{4} (\sqrt{2} + 1) \end{aligned}$$

- Se også udregningerne i Maple-worksheet: Eksempel 0.